

HEMORAL



IJZERTOEIDENING BIJ BIGGEN

L' ADMINISTRATION DE FER CHEZ LES PORCELETS



WWW.AGROLOGIC.BE

AGRO LOGIC



TOEDIENINGSPERIODE

Hemoral wordt 3 x toegediend tussen de 2e à 4e dag en de 8e à 12e dag.

TOEDIENEN VAN HEMORAL IN DE BIGGENNESTEN

Hemoral mag op de bodem gelegd worden, indien de warmteplaat ruw en groot genoeg is. Hemoral kan best in een playfeeder gebruikt worden, zeker indien meer dan 50% van de oppervlakte van de kraamkooi uit roostervloer bestaat. Hemoral moet altijd nabij de kop van de zeug gevoederd worden, maar wel op deze manier dat de zeug er niet bij kan.

Traditionele voederbakken mogen niet gebruikt worden omdat de randen te hoog zijn voor pasgeboren biggen. Tijdens de toepassing van Hemoral wordt best geen ander voeder verstrekt.

WAT DOE IK BIJ ...

• Biggen die verlegd worden?

Bij deze biggen wordt de gewone routine van toediening gevuld of voortgezet als bij de zeug.

• Pleegzeugen?

Bij verleggen 1 schepje Hemoral geven en daarna de gewone routine volgen.

DE 4 GOUDEN REGELS

1. De plaatsing van de Playfeeder is heel belangrijk!
2. Hemoral altijd aanbieden in een Playfeeder of op een ruwe ondergrond.
3. Hemoral wordt 3 x gegeven vanaf dag 2 à 4 tot dag 8 à 12
4. Hemoral wordt best alleen gegeven, zonder toevoeging van andere voeders.



1e toediening:
Biggen van 2 à 4 dagen oud



2e en 3e toediening:
Biggen van 6 à 12 dagen
oud. Hetgeen rest mag niet
verwijderd worden



Na een paar dagen mag het
voeder gestrooid worden
op wat rest van de Hemoral

1e administration:
Porcelets de 2 à 4 jours

Porcelets de 6 à 8jours. Ce qui
reste ne doit pas être enlevé.
Il suffit d'en remettre dessus.

Après quelques jours,
L'alimentation peut être
saupoudrée sur ce qui rest
d'hemoral.

INTERVALLE DE DOSAGE

Hemoral est administrer 3 fois entre le 2ème et 4ème, le 8ème jour et à 12jours

ADMINISTRATION DE HEMORAL CHEZ LES PORCELETS

Hemoral est mieux administré par un playfeeder au propre et seche, sur une surface rugueuse. Hemoral peut être place sur le sol, si la plaque chauffante est rugueuse et assez grande. Il preférable d'utiliser hemoral dans un playfeeder, surtout si plus de 50% de la surface de la maternité est grillagée.Hemoral doit toujours être près de la tête de la truie, mais sans que celle -ci ne puisse en avoir acces. Les mangeoires traditionnelles ne peuvent être utilisés, les bords sont trop élevés pour les porcelets nouveau- nés. Lors de l'application d' hemoral ne pas administrer d'autre alimentation.

CE QUE JE FAIS À...

• Porcelots étant déplacés?

Pour ces porcelets, la routine ordinaire de l'administration est suivie poursuivei que si la truie.

• Trui adoptive?

Donner une mesurette et ensuite suivre la routine

LES QUATRE RÈGLES D'OR

1. La placement du playfeeder est très important
2. Hemoral est toujours administer dans un playfeeder ou sur une surface rugueuse.
3. Hemoral est donné 3fois du jours 2,4 8 et 12.
4. Hemoral est mieux administer seul, sans l'ajout d'autres denrées.

