



## Bonne condition des trayons



## Trayons en mauvais état



# Avez-vous la traite vraiment dans les doigts ?



## Les trayeurs 8 étoiles...

- ★ produisent plus de lait
- ★ obtiennent toujours le taux de cellules le plus bas
- ★ ont moins d'infections mastites
- ★ perdent moins de temps aux traitements mastites
- ★ obtiennent un rendement maximal



# Les trayeurs 8 étoiles font plus de bénéfice

Des entreprises laitières qui ont une attention particulière pour la prévention de la mastite et qui ont donc un taux de cellules plus bas, sont des entreprises plus rentables.

Un taux de cellules plus bas signifie en effet plus de bénéfice. Si le taux de cellules baisse de 100.000 cellules/ml, la production de lait augmente de 0,5 l par vache/jour !

Pour une entreprise de 60 vaches laitières, cela procure une différence de plus de 10.000 litres de lait par an. De plus, vous fuyez les amendes, vous évitez l'antibiotique, vous diminuez les coûts de vétérinaire et beaucoup de travail inutile. (et les frustrations).

Il y a 3 points critiques pendant la routine laitière :

- 1) **La propreté des trayons lors de la traite.**  
Moins de cellules sur les trayons pour la traite donnera moins de risque de mastite.
- 2) **Le contact entre les trayons et le collecteur.** Traire peut procurer une détérioration des trayons ce qui augmente le risque de contamination. Donc gardez une pression minimale sur les trayons et évitez la sur-traite.
- 3) **Le traitement des trayons tout de suite après la traite.** Après la traite, le sphincter reste encore ouvert par lequel des germes peuvent entrer. Un bon post-trempage, immédiatement après la traite, ferme le sphincter.

La routine laitière du trayeur 8 étoiles est ciblée pour suivre scrupuleusement ces 3 points critiques dès la base.

## La routine laitière du trayeur 8 étoiles

**NOUVEAU  
BREVETÉ**

### Porter des gants de trayeur

Le fait de porter des gants de trayeur réduit le transfert de germes via les mains de 90%.



### Utiliser le Pure Dipper

Le Pure Trempage garantit une utilisation optimale du trempage :

- meilleur recouvrement autour du trayon
- fonctionnement plus efficace : il ne faut plus rien ajouter dans le gobelet
- plus fiable lors de l'utilisation



### Utiliser le Pure Foamer

Le Pure Foamer garantit une optimisation du moussage :

- le trayon est mieux couvert
- durée de contact plus longue
- meilleur nettoyage et meilleure désinfection
- plus facile à utiliser avec le gobelet à mousse



### Utiliser du papier pour sécher les trayons

- nettoyer humide - traire à sec
- les trayons doivent être secs pour la traite
- utiliser un papier par vache



### Mousser les trayons au préalable

Mousser fonctionne mieux qu'utiliser un spray :

- moins de gaspillage
- meilleur nettoyage
- les germes sur les trayons sont réduites au maximum
- meilleure stimulation



### Utiliser le Cluster Dip

Désinfectez les clusters pour mammites d'origine contagieuse et évitez de transférer les germes par le collecteur.



### Tremper immédiatement après la traite

Le post-trempage, immédiatement après la traite est important pour fermer le sphincter et pour garder les trayons en bonne condition.

Tremper offre 3 avantages par rapport au spray :

- la couche de protection est plus épaisse et la peau est mieux soignée
- moins de gaspillage
- le sphincter est mieux fermé



### Utiliser des tétines aérées

Des tétines aérées, triangulaires se chargent de :

- une traite plus douce
- moins de hyperkératose
- évacuation de lait plus rapide
- moins de sur-traite
- trayons en meilleure condition

